



**FARMA - CHEM SA**

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047  
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: [info@farmachem.gr](mailto:info@farmachem.gr)

**ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΑΜΙΝΟΞΕΑ**

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ**

**ΠΡΟΪΟΝ:**  
**POWER – 7 B**

Είναι εξειδικευμένο λίπασμα για τις καλλιέργειες που είναι απαιτητικές σε Βόριο όπως ελιές, τεύτλα, αμυγδαλιές, αμπέλι κλπ. Αποτελεί ένα ισχυρό μέσο αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη του Βορίου.

Ταυτόχρονα ενισχύει με τα απαραίτητα για την φυσιολογική ανάπτυξη και καρποφορία ιχνοστοιχεία σε πλήρως αφομοιώσιμη χηλική μορφή.

Συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα, τα οποία πρέπει να προστίθενται τελευταία κατά την ανάμιξη. Το διάλυμα ψεκάζεται, μόνο του ή σε συνδυασμό με όλους τους συνήθεις ψεκαστήρες πιέσεως και χαμηλού όγκου ενώ πρέπει να ψεκάζεται το ταχύτερο δυνατό, από την παρασκευή του. Ψεκάστε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ χωρίς προσθήκη διαβρεκτικού.

**Σύνθεση β/ο:**

Βόριο (B) 10%  
Σύμπλοκο αιθονολαμίνης  
100% Υδατοδιαλυτό

**Εφαρμογές - Δοσολογία:**

**Γενική Δόση:** 150-250 γρ. / στρέμμα ή 1 κιλό στα 1000 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος.

**Ελιά:** Σε 2 τουλάχιστον εφαρμογές, πρώτη κατά τη έναρξη της άνθησης, δεύτερη μετά το τέλος της άνθησης.

**Τεύτλα:** Σε μια ή δύο εφαρμογές στο στάδιο των 6-8 φύλλων.

**Ροδακινιά – Μηλιά – Αχλαδιά – Αμυγδαλιά – Κερασιά:** Πρώτη εφαρμογή στο τέλος της άνθησης. Δεύτερη εφαρμογή 10-15 ημέρες μετά.

**Αμπέλι:** Πρώτη εφαρμογή, στην αρχή της ανάπτυξης νέων βλαστών. Δεύτερη πριν την άνθηση, τρίτη εφαρμογή (σε πολύ έντονο πρόβλημα) στον σχηματισμό του τσαμπιού.

**Κηπευτικά:** Πρώτη εφαρμογή αφού τα φυτά αποκτήσουν αρκετό φύλλωμα, περίπου ένα μήνα μετά το φύτεμα.

**Μεγάλες καλλιέργειες:** Καλαμπόκι, τριφύλλι, βαμβάκι, σιτάρι κλπ. Μία ή δύο εφαρμογές ανάλογα με το πρόβλημα, σύμφωνα με τη γενική δόση.