



FARMA - CHEM SA

Τ.Θ. 1026 ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 - 569 630 έως 33 FAX: 2310 - 797 047
<http://www.farmachem.gr>, e-mail: info@farmachem.gr

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΡΟΪΟΝ:
BIOSHELL ZFC

Βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών.

Οίκος παραγωγής: αγροΟΙΚΟσύστημα Ε.Ε.

Παρασκευή και Συσκευασία: FARMA-CHEM SA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το BIOSHELL ZFC συμμετέχει στις διεργασίες ανάπτυξης των φυτών, μειώνοντας το stress. Έχει διελασματική διείσδυση, προσκολλάται και καλύπτει πλήρως στην ψεκαζόμενη επιφάνεια του φυτού. Λόγω της κοκκομετρίας, της ειδικής μορφής του κρυστάλλου του και της φόρτισής του (περιέχει στο εσωτερικό του ιονισμένα μόρια νερού) προσδίδει επί πλέον ενέργεια στα φυτά. Έχει την ικανότητα να προσροφά την περισσή υγρασία στην φυτική επιφάνεια (αφυγραντική δράση) και προστατεύει τα φυτά από την UV ακτινοβολία.

Σύνθεση (β/β)

Περιέχει οργανικές ενώσεις 2% β/β ως σύμπλοκα φυσικών αλουμινοπυριτικών ορυκτών και ένυδρο θειϊκό χαλκό 12,5% β/β.

Το BIOSHELL ZFC ενισχύει την φωτοσύνθεση, την σπαργή και τη συνολική ευρωστία των καλλιεργειών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Γκρέϊπ φρουτ): Γίνονται ψεκασμοί πριν την άνθηση και στο στάδιο της καρπόδεσης. Δόση: 800-1000γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρ.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Γίνονται ψεκασμοί πριν την άνθηση, στην πτώση των πετάλων, στο καρπίδιο και στην αύξηση του καρπού. Δόση: 800-1000γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρ.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Βυσσινιά): Γίνονται ψεκασμοί πριν την άνθηση στην πτώση των πετάλων, στο καρπίδιο και στην αύξηση του καρπού. Δόση: 800-1000γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρ.

Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο, Σουλτανίνα, Σταφίδα): Γίνονται οι εξής ψεκασμοί, α) 2 πριν την άνθηση, β) στην καρπόδεση, γ) στο κλείσιμο της σταφυλής,

δ) στο γέμισμα του βότρεως και ε) στην αλλαγή του χρώματος. Δόση: 800-1000γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

Ακτινίδια: Γίνονται ψεκασμοί στην νέα βλάστηση, πριν την άνθηση στην καρπόδεση και στην αύξηση του καρπού. Δόση: 800-1000γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ.

Ελιά: Γίνονται ψεκασμοί νωρίς την άνοιξη, μέχρι την καρπόδεση και από το τέλος του καλοκαιριού μέχρι τις αρχές του χειμώνα. Δόση: 800-1000γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-300 λίτρα/στρ.

Τομάτα (υπαιθρια-βιομηχανική), Πιπεριά, Μελιτζάνα: Γίνονται ψεκασμοί, 20-30 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, πριν την άνθηση, στην καρπόδεση και στην αύξηση του καρπού. Δόση: 800-1000γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι: Γίνονται ψεκασμοί, στο 4ο-5ο φύλλο, έως πριν την άνθηση. Δόση: 800-1000γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.

Πατάτα: Γίνονται ψεκασμοί πριν το κλείσιμο της γραμμής, στην κονδυλοποίηση και μέχρι πριν το κάψιμο του φυλλώματος. Δόση: 800-1000γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

Αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά: Γίνονται ψεκασμοί, 20-30 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, πριν την άνθηση, και στην αύξηση των φυτών. Δόση: 600-800γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 800-1000 γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-200 λίτρα/στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Δεν εφαρμόζεται σε φυτά μικρής ηλικίας (κάτω των 15 ημερών) ή αμέσως μετά την μεταφύτευση. • Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. • Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δοσολογίες. • Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. • Καθαρίστε τα ψεκαστικά μηχανήματα πριν και μετά από κάθε εφαρμογή. • Κατά την χρήση να λαμβάνονται τα συνήθη και απαραίτητα μέτρα προστασίας. • Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. • Χρειάζεται ανάδευση κατά τη διάλυση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα εκτός από τα πολύ αλκαλικά. Δεν συνδυάζεται με θερινό πολτό. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους για περισσότερες πληροφορίες.

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 2107793777

Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Κυκλοφορεί ως βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών για χρήση στην γεωργία σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35).

**Κατάλληλο και για Βιολογική καλλιέργεια
(Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ αριθ. 889/2008)**